



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



ITG26SAR1878 - Foce di Bau de Lisperda

Descrizione

La Foce di Bau de Lisperda è la parte terminale del Rio che sfocia nell'omonima spiaggetta all'interno del Comune di Gairo. Il sito, alle fauci delle circostanti colline granitiche, appare in buono stato, se non fosse per la relativa eccessiva pressione turistica estiva e il conseguente disturbo della fauna legata alla frequentazione e, soprattutto al transito autoveicoli nella strada asfaltata confinante e nel parcheggio sterrato. Il chiosco e i servizi appaiono ben posizionati nella parte rocciosa a monte a non, come spesso accade, a gravare sugli ecosistemi più fragili di spiaggia. La vegetazione predominante è costituita da tamerici (*Tamarix gallica*), agnocasto (*Vitex agnus-castus*) e cannuccia palustre (*Phragmites australis*). All'interno della acque salmastre vivono le tipiche specie ittiche, quali la spigola e l'anguilla mentre, per quanto riguarda l'avifauna e l'erpetofauna, non sono state rinvenute specie di particolare rilievo, anche se non si esclude la presenza del discoglossa, la raganelle sarda e la natrice viperina. [Monitoraggio in campo: M. Fois, A. Cuenca, 26.05.2018]

Informazioni generali

Informazioni di base

Localizzazione della zona umida:	Marino/costiero
Naturale / Artificiale:	Naturale
Tipologia di zona umida:	Estuario
Superficie (ha):	1.3
Hydrological interaction with other wetland:	No -
Salinità dell'acqua:	Salmastra (5.0-18.0 g/l)
Immissione acqua dolce:	Torrente / Corso d'acqua
Idroperiodo:	Permanente

Informazione geografica

Regione autonoma:	Sardegna
Provincia:	Nuoro
Isola:	Sardegna
Comune:	Gairo
Coordinates (WGS84):	9.673224 E - 39.753636 N

Ramsar wetland types

Tipologia Ramsar	Copertura (%)
E -- Spiagge di sabbia, ghiaia o ciottoli; include barre di sabbia, lingue di terra e isolette sabbiose; include i sistemi di dune e gli stagni retrodunali	26 - 50
F -- Acque di estuario; acqua permanente di estuari e sistemi di estuari di delta	26 - 50
H -- Paludi intertidali; comprende saline, prati salati, saline, paludi salate in rilievo; include paludi salmastre di marea e d'acqua dolce	< 5

Stati di protezione e altre designazioni

Stato di protezione

Categoria di stato di protezione	Sottocategoria di stato di protezione	Nome del sito	Codice	Copertura (%)	Legislazione
Altre aree protette	Foresta demaniale	Monte Ferru	LA4_5	100	N.A.

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Attività nella zona umida

Attività	Intensità
690 = Altri impatti per il tempo libero e il turismo non menzionati sopra	Media

Habitat & Vegetazione

Tipologie di habitat

Tipologie di habitat	Copertura (%)
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	5 - 25
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici	< 5
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)	26 - 50
1130 Estuari	26 - 50
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.	< 5

Specie

Flora

Specie	Dominanza	Reference
Juncus maritimus	Presente	Fois & Cuenca 26.05.2018
Phragmites australis		Fois & Cuenca 26.05.2018
Ruppia maritima		Fois & Cuenca 26.05.2018
Tamarix gallica		Fois & Cuenca 26.05.2018
Vitex agnus-castus		Fois & Cuenca 26.05.2018

Fauna

Pesci	Presenza nella zona umida	Riferimenti bibliografici
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)	Comune	
Mugil cephalus Linnaeus, 1758	Comune	
Sparus aurata Linnaeus, 1758	Comune	

Riferimenti bibliografici

Representative Image & Map



