© 2019 Centro Conservazione Biodiversità, Università degli Studi di Cagliari (Unica-CCB), Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania (Unict-DBGES), PIM Initiative.

ITG27ANT0008 - Foce a Cussorgia

Descrizione

La Foce a Cussorgia è rappresentata dallo sbocco a mare di un piccolo torrente in prossimità della piccola frazione di circa 60 abitanti di Cussorgia nel comune di Calasetta, dal cui centro dista circa 4 chilometri. Il sito è comunque frequentato come centro balneare con villaggi residenziali per vacanze e ristoranti.
Dal punto di vista ambientale, il sito non presenta particolari rilevanze, essendo essenzialmente composto da canneti di Phragmites australis e Arundo donax. Tuttavia, la qualità delle acque, apparentemente eutrofiche, così come la presenza di rifiuti solidi, costituiscono una minaccia per tutto l'ambiente circostante che andrebbe quantomeno monitorata.
[Monitoraggio in campo: M. Fois, A. Cuena, 13.05.2018]

Informazioni generali

Informazioni di base

Localizzazione della zona umida:	Marino/costiero
Naturale / Artificiale:	Naturale
Tipologia di zona umida:	Acquitrino / Palude
Superficie (ha):	0.1
Hydrological interaction with other wetland:	No -
Salinità dell'acqua:	Salmastra (5.0-18.0 g/l)
Idroperiodo:	Temporanea/Intermittente

Informazione geografica

Regione autonoma:	Sardegna
Provincia:	Cagliari
Isola:	Sant\'Antioco
Comune:	Calasetta
Coordinates (WGS84):	8.396286 E - 39.101591 N

Ramsar wetland types

Tipologia Ramsar	Copertura (%)
H -- Paludi intertidali; comprende saline, prati salati, saline, paludi salate in rilievo; include paludi salmastre di marea e d'acqua dolce	> 95

Stati di protezione e altre designazioni

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Attività nella zona umida

Attività	Intensità
423 = dischariche di inerti	Media
952 = eutrofizzazione	Alta

Impatti

Impact type	Intensità
PSO = Inquinamento da liquami di sconosciuta severità/durata	Alta

Habitat & Vegetazione

Tipologie di habitat

Tipologie di habitat	Copertura (%)
1150 * Lagune costiere	51 - 75
1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia)	< 5
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)	5 - 25
2250 * Dune costiere con Juniperus spp.	< 5
1120 * Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)	26 - 50
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	< 5
2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)	5 - 25
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia	5 - 25
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)	< 5
2110 Dune embrionali mobili	5 - 25
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	5 - 25
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	5 - 25

Specie

Flora

Specie	Dominanza	Reference
Arundo donax	Co-dominante	Fois & Cuena 13.05.2018
Convolvulus sepium		Milia & Mossa 1977
Imperata cylindrica		Milia & Mossa 1977
Phragmites australis	Co-dominante	Fois & Cuena 13.05.2018
Rubus ulmifolius	Presente	Fois & Cuena 13.05.2018
Sporobolus pumilus		Milia & Mossa 1977
Thinopyrum junceum		Milia & Mossa 1977
Typha angustifolia		Milia & Mossa 1977

Riferimenti bibliografici

Representative Image & Map

© 2019 Centro Conservazione Biodiversità, Università degli Studi di Cagliari (Unica-CCB), Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania (Unict-DBGES), PIM Initiative.

Centro Conservazione Biodiversità, Università degli Studi di Cagliari (Unica-CCB), Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania (Unict-DBGES), PIM Initiative. (2019). Rapporto d'inventario: ITG27ANT0008 - Foce a Cussorgia. ItIsWet – Database delle zone umide delle isole italiane.
https://italiaiswet.it/general/report.php?id=85&lang=it (Accessibile su 09.05.2024)
Aggiornamento: 08.2020